

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave



Définition

Glycémie <0.45g/L chez nouveau-né.



Symptômes

Tremblements cyanose apnée convulsions

léthargie



Causes

Prématurité diabète maternel RCIU infection



Complications

Séquelles neurologiques si prolongée



Traitement

G10% IV alimentation précoce



Diagnostic différentiel

Sepsis hypothermie insuffisance surrénale



Examens paracliniques

Glycémie capillaire insulïnémie si récidivante



Protocole médicamenteux

G10% 2ml/kg IV bolus puis perfusion 6-8mg/kg/min; Alimentation précoce; Surveillance glycémie/3h; Diazoxide si hyperinsulinisme



Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

☑ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation

Urgences

monitoring

Prise en charge adaptée à la gravité

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON: Posologies mg/kg

ENFANT: Posologies poids

ADULTE: Posologies standard

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.