

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave

## Définition

Malformation anorectale congénitale.

## Symptômes

Absence orifice anal

abdomen distendu

vomissements bilieux

## Causes

Malformation congénitale

syndrome VACTERL

## Complications

Occlusion néonatale

fistule

## Traitement

Chirurgie néonatale (anoplastie

colostomie)

## Diagnostic différentiel

Atrésie intestinale

Hirschsprung

## Examens paracliniques

ASP

échographie périnéale

IRM pelvienne

## Protocole médicamenteux

Basse: Anoplastie périnéale néonatale; Haute: Colostomie puis PSARP (Peña) à 3-6 mois; Bilan VACTERL complet

## Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

## ☑ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation

Urgences

monitoring

Prise en charge adaptée à la gravité

## ☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON: Posologies mg/kg

ENFANT: Posologies poids

ADULTE: Posologies standard

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.