

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave

## Définition

Carcinome épidermoïde anal.

## Symptômes

Douleur anale rectorragies masse prurit

## Causes

HPV 16/18 VIH immunodépression

## Complications

Métastases inguinales sténose

## Traitement

Radiochimiothérapie (Nigro) chirurgie si échec

## Diagnostic différentiel

Hémorroïdes fissure condylome géant Bowen

## Examens paracliniques

Anuscopie+biopsie IRM pelvienne TEP-scanner

## Protocole médicamenteux

Protocole Nigro: 5-FU 1000mg/m<sup>2</sup> J1-4 + Mitomycine 10mg/m<sup>2</sup> J1 + Radiothérapie 45-59Gy; Chirurgie AAP si récidence; Vaccination HPV prévention

## Interprétation des examens

Interpréter selon clinique

## ☑ Prise en charge hospitalière

Prise en charge adaptée

## ☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON: mg/kg

ENFANT: Poids

ADULTE: Standard

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.