

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave

●

Définition

Infection oculaire du nouveau-né.

●

Symptômes

Œil rouge

sécrétions purulentes

paupières collées

●

Causes

Gonocoque (J2-5)

Chlamydia (J5-14)

collyres prophylactiques

●

Complications

Cécité si gonocoque

pneumonie si Chlamydia

●

Traitement

ATB selon germe

●

Diagnostic différentiel

Obstruction canale lacrymale

herpès néonatal

●

Examens paracliniques

Prélèvement conjonctival

PCR Chlamydia/gonocoque

●

Protocole médicamenteux

Gonocoque: Ceftriaxone 25-50mg/kg IM dose unique; Chlamydia: Érythromycine 50mg/kg/j PO 14j; Prophylaxie: Rifamycine collyre H1

●

Interprétation des examens

Interpréter selon clinique



 Prise en charge hospitalière

Prise en charge adaptée



 Protocole par tranche d'âge

 NOURRISSON: mg/kg
 ENFANT: Poids
 ADULTE: Standard

 **Avertissement** :  GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un medecin qualifié pour tout problème de santé.