

Gravité MOYENNE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave

Définition

Maladie de Verneuil, inflammation chronique glandes apocrines.

Symptômes

Nodules douloureux récidivants aisselles/aïnes abcès

fistules

Causes

Occlusion folliculaire tabac obésité génétique

Complications

Cicatrices rétractiles fistules chroniques

dépression

Traitement

Antibiothérapie adalimumab chirurgie

arrêt tabac

Diagnostic différentiel

Furonculose kyste épidermique lymphome cutané Crohn cutané

Examens paracliniques

Clinique (stade Hurley I-III) biopsie si doute CRP NFS

Protocole médicamenteux

Hurley I: Clindamycine 1% topique; II: Doxycycline 100mg x2/j 3 mois; III: Adalimumab 160mg→80mg→40mg/sem; Chirurgie exérèse large; Arrêt tabac impératif

Interprétation des examens

NFS: Rechercher anémie (Hb<12g/dL femme <13 homme) hyperleucocytose (>10000) ou leucopénie (<4000)

thrombopénie (<150000) CRP/VS: CRP>5mg/L = inflammation >100mg/L = infection bactérienne probable

VS accélérée si >20mm/h

Prise en charge hospitalière

Hospitalisation courte durée ou surveillance ambulatoire selon évolution Réévaluation clinique à 48-72h

adaptation thérapeutique Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récurrences Évaluation pré-opératoire: consultation anesthésie

bilan pré-op jeûne

Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.