

Gravité GRAVE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave



Définition

Incapacité du cœur à assurer un débit sanguin suffisant aux besoins de l'organisme.



Symptômes

- Dyspnée d'effort puis de repos
- œdèmes des membres inférieurs
- fatigue
- orthopnée
- prise de poids



Causes

- Cardiopathie ischémique
- hypertension
- valvulopathies
- cardiomyopathies



Complications

- Œdème aigu du poumon
- arythmies
- insuffisance rénale
- décès



Traitement

- IEC/ARA2
- bêtabloquants
- diurétiques
- anti-aldostérone
- règles hygiéno-diététiques



Diagnostic différentiel

- Autres causes de douleur thoracique
- embolie pulmonaire
- dissection aortique
- causes digestives



Examens paracliniques

- ECG
- troponine
- échocardiographie
- bilan lipidique
- radiographie thoracique



Protocole médicamenteux

IEC/ARA2, bêtabloquants, diurétiques, anti-aldostérone, règles hygiéno-diététiques

Interprétation des examens

ECG: Rechercher signes d'ischémie (sus/sous-décalage ST) troubles du rythme

Troponine: Élévation = souffrance myocardique cinétique sur 2 dosages

Prise en charge hospitalière

Hospitalisation en service spécialisé selon gravité Surveillance rapprochée des constantes

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récives

Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

Avertissement : GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.