

Gravité MOYENNE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave



Définition

Trouble du rythme cardiaque caractérisé par une activité électrique auriculaire anarchique.



Symptômes

Palpitations dyspnée fatigue
parfois asymptomatique pouls irrégulier



Causes

Hypertension valvulopathies hyperthyroïdie
âge avancé cardiopathie



Complications

AVC embolique insuffisance cardiaque
cardiomyopathie rythmique



Traitement

Anticoagulation contrôle de fréquence/rythme
cardioversion ablation



Diagnostic différentiel

Autres causes de douleur thoracique embolie pulmonaire dissection aortique causes digestives



Examens paracliniques

ECG troponine échocardiographie bilan lipidique radiographie thoracique



Protocole médicamenteux

Anticoagulation, contrôle de fréquence/rythme, cardioversion, ablation

Interprétation des examens

ECG: Rechercher signes d'ischémie (sus/sous-décalage ST) troubles du rythme

Troponine: Élévation = souffrance myocardique cinétique sur 2 dosages

Prise en charge hospitalière

Hospitalisation courte durée ou surveillance ambulatoire selon évolution Réévaluation clinique à 48-72h

adaptation thérapeutique Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage Planification du suivi

Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ Avertissement : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.