

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave



Définition

État de choc secondaire à une défaillance aiguë de la fonction de pompe cardiaque.



Symptômes

Hypotension sévère

marbrures

extrémités froides

confusion

oligurie



Causes

Infarctus étendu

myocardite fulminante

valvulopathie aiguë

arythmie sévère



Complications

Défaillance multiviscérale

décès



Traitement

Support inotrope

assistance circulatoire

traitement de la cause

unité de soins intensifs



Diagnostic différentiel

Autres causes de douleur thoracique

embolie pulmonaire

dissection aortique

causes digestives



Examens paracliniques

ECG

troponine

échocardiographie

bilan lipidique

radiographie thoracique



Protocole médicamenteux

Support inotrope, assistance circulatoire, traitement de la cause, unité de soins intensifs



📋 **Interprétation des examens**

- ECG: Rechercher signes d'ischémie (sus/sous-décalage ST)
- troubles du rythme
- Troponine: Élévation = souffrance myocardique
- cinétique sur 2 dosages



📋 **Prise en charge hospitalière**

- Admission urgences
- évaluation ABCDE
- monitoring continu (scope
- SpO2
- PA)
- Pose VVP x2 gros calibre
- bilan sanguin urgent
- Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité
- Surveillance rapprochée
- Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage
- Planification du suivi post-hospitalisation



📋 **Protocole par tranche d'âge**

- NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute
- ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour
- ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.