

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave

●

Definition

Compression aiguë du cœur par un épanchement péricardique abondant ou rapide.

●

Symptômes

Dyspnée tachycardie hypotension
turgescence jugulaire pouls paradoxal

●

Causes

Péricardite traumatisme dissection aortique
néoplasie

●

Complications

Choc obstructif arrêt cardiaque

●

Traitement

Ponction péricardique en urgence (péricardiocentèse)
drainage chirurgical

●

Diagnostic différentiel

Autres causes de douleur thoracique embolie pulmonaire dissection aortique causes digestives

●

Examens paracliniques

ECG troponine échocardiographie bilan lipidique radiographie thoracique

●

Protocole médicamenteux

Ponction péricardique en urgence (péricardiocentèse), drainage chirurgical



📋 **Interprétation des examens**

- ECG: Rechercher signes d'ischémie (sus/sous-décalage ST)
- troubles du rythme
- Troponine: Élévation = souffrance myocardique
- cinétique sur 2 dosages



📋 **Prise en charge hospitalière**

- Admission urgences
- évaluation ABCDE
- monitoring continu (scope
- SpO2
- PA)
- Pose VVP x2 gros calibre
- bilan sanguin urgent
- Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité
- Surveillance rapprochée
- Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage
- Planification du suivi post-hospitalisation



📋 **Protocole par tranche d'âge**

- NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute
- ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour
- ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.