

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave



Définition

Déchirure de la paroi interne de l'aorte créant un faux chenal circulatoire.



Symptômes

Douleur thoracique déchirante migratrice

asymétrie tensionnelle

syncope



Causes

Hypertension artérielle chronique

maladie de Marfan

traumatisme



Complications

Rupture aortique

tamponnade

ischémie d'organe

décès



Traitement

Contrôle tensionnel agressif

chirurgie en urgence si type A



Diagnostic différentiel

Autres causes de douleur thoracique

embolie pulmonaire

dissection aortique

causes digestives



Examens paracliniques

ECG

troponine

échocardiographie

bilan lipidique

radiographie thoracique



Protocole médicamenteux

Contrôle tensionnel agressif, chirurgie en urgence si type A



📋 **Interprétation des examens**

- ECG: Rechercher signes d'ischémie (sus/sous-décalage ST) troubles du rythme
- Troponine: Élévation = souffrance myocardique cinétique sur 2 dosages



📋 **Prise en charge hospitalière**

- Admission urgences évaluation ABCDE monitoring continu (scope SpO2 PA) Pose VVP x2 gros calibre
- bilan sanguin urgent Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité Surveillance rapprochée
- Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage Planification du suivi post-hospitalisation



📋 **Protocole par tranche d'âge**

- NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute
- ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour
- ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.