

Gravité MOYENNE

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave



Définition

Vascularite inflammatoire touchant les petites et moyennes artères, fortement liée au tabagisme.



Symptômes

Claudication distale

douleurs de repos

ulcérations digitales

phénomène de Raynaud



Causes

Tabagisme actif quasi-constant

prédisposition génétique



Complications

Nécrose digitale

amputation



Traitement

Arrêt total et strict du tabac

vasodilatateurs

prostacyclines



Diagnostic différentiel

Autres causes de douleur thoracique

embolie pulmonaire

dissection aortique

causes digestives



Examens paracliniques

ECG

troponine

échocardiographie

bilan lipidique

radiographie thoracique



Protocole médicamenteux

Arrêt total et strict du tabac, vasodilatateurs, prostacyclines



📋 Interprétation des examens

- ECG: Rechercher signes d'ischémie (sus/sous-décalage ST) troubles du rythme
- Troponine: Élévation = souffrance myocardique cinétique sur 2 dosages



📋 Prise en charge hospitalière

- Hospitalisation courte durée ou surveillance ambulatoire selon évolution Réévaluation clinique à 48-72h
- adaptation thérapeutique Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage Planification du suivi



📋📋📋📋📋 Protocole par tranche d'âge

- NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute
- ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour
- ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.