

Gravité GRAVE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave

•

Définition

Maladie respiratoire chronique caractérisée par une obstruction progressive et peu réversible des voies aériennes.

•

Symptômes

- Toux chronique
- expectorations
- dyspnée d'effort progressive
- sifflements

•

Causes

- Tabagisme (principale cause)
- exposition professionnelle
- pollution

•

Complications

- Exacerbations aiguës
- insuffisance respiratoire
- cœur pulmonaire chronique

•

Traitement

- Arrêt du tabac
- bronchodilatateurs
- corticoïdes inhalés
- réhabilitation respiratoire
- oxygénothérapie

•

Diagnostic différentiel

- Autres pneumopathies
- insuffisance cardiaque
- embolie pulmonaire
- cancer bronchique

•

Examens paracliniques

- Radiographie thoracique
- gazométrie artérielle
- NFS
- CRP
- scanner thoracique si besoin

•

Protocole médicamenteux

Arrêt du tabac, bronchodilatateurs, corticoïdes inhalés, réhabilitation respiratoire, oxygénothérapie

■

☐☐ Interprétation des examens

Gazométrie: pH 7.35-7.45

PaO2>80mmHg

PaCO2 35-45mmHg

Acidose si pH<7.35

Radiographie: rechercher opacités

épanchements

pneumothorax

■

☐☐ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation en service spécialisé selon gravité

Surveillance rapprochée des constantes

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récides

●

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.