

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave

•

Définition

Présence d'air dans la cavité pleurale entraînant un collapsus pulmonaire partiel ou total.

•

Symptômes

Douleur thoracique brutale

dyspnée

diminution du murmure vésiculaire unilatéral

•

Causes

Rupture de bulles sous-pleurales

sujet jeune longiligne

BPCO

•

Complications

Pneumothorax compressif (suffocant)

insuffisance respiratoire

•

Traitement

Exsufflation

drainage thoracique si volumineux

chirurgie si récurrence

•

Diagnostic différentiel

Autres pneumopathies

insuffisance cardiaque

embolie pulmonaire

cancer bronchique

•

Examens paracliniques

Radiographie thoracique

gazométrie artérielle

NFS

CRP

scanner thoracique si besoin

•

Protocole médicamenteux

Exsufflation, drainage thoracique si volumineux, chirurgie si récurrence



📋 **Interprétation des examens**

Gazométrie: pH 7.35-7.45

PaO2>80mmHg

PaCO2 35-45mmHg

Acidose si pH<7.35

Radiographie: rechercher opacités

épanchements

pneumothorax



📋 **Prise en charge hospitalière**

Admission urgences

évaluation ABCDE

monitoring continu (scope

SpO2

PA)

Pose VVP x2 gros calibre

bilan sanguin urgent

Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité

Surveillance rapprochée

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation



📋 **Protocole par tranche d'âge**

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.