

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave



Définition

Insuffisance respiratoire néonatale liée à un déficit en surfactant pulmonaire.



Symptômes

Polypnée

geignement expiratoire

tirage

cyanose dès les premières heures de vie



Causes

Prématurité

déficit en surfactant

diabète maternel



Complications

Hypoxie sévère

hémorragie intraventriculaire

décès



Traitement

Surfactant exogène

ventilation assistée

corticothérapie anténatale préventive



Diagnostic différentiel

Autres pneumopathies

insuffisance cardiaque

embolie pulmonaire

cancer bronchique



Examens paracliniques

Radiographie thoracique

gazométrie artérielle

NFS

CRP

scanner thoracique si besoin



Protocole médicamenteux

Surfactant exogène, ventilation assistée, corticothérapie anténatale préventive



▣▣ Interprétation des examens

Gazométrie: pH 7.35-7.45

PaO2>80mmHg

PaCO2 35-45mmHg

Acidose si pH<7.35

Radiographie: rechercher opacités

épanchements

pneumothorax



▣▣ Prise en charge hospitalière

Admission urgences

évaluation ABCDE

monitoring continu (scope

SpO2

PA)

Pose VVP x2 gros calibre

bilan sanguin urgent

Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité

Surveillance rapprochée

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation



▣▣▣▣▣ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.