

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave

•

Définition

Arrêt du transit intestinal par obstacle mécanique ou trouble fonctionnel.

•

Symptômes

Douleurs abdominales

vomissements

arrêt des matières et des gaz

météorisme

•

Causes

Brides post-opératoires

hernie étranglée

tumeur

volvulus

•

Complications

Ischémie intestinale

perforation

choc septique

•

Traitement

Aspiration digestive

réhydratation

chirurgie si mécanique

•

Diagnostic différentiel

Autres causes de douleur abdominale

pathologies biliaires

pancréatiques ou intestinales

•

Examens paracliniques

NFS

bilan hépatique

échographie abdominale

endoscopie digestive selon contexte

•

Protocole médicamenteux

Aspiration digestive, réhydratation, chirurgie si mécanique



📋 **Interprétation des examens**

- Bilan hépatique: ALAT/ASAT >3N = cytolyse
- GGT/PAL élevées = cholestase
- Échographie: rechercher collections
- dilatations des voies biliaires



📋 **Prise en charge hospitalière**

- Admission urgences
- évaluation ABCDE
- monitoring continu (scope
- SpO2
- PA)
- Pose VVP x2 gros calibre
- bilan sanguin urgent
- Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité
- Surveillance rapprochée
- Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage
- Planification du suivi post-hospitalisation



📋 **Protocole par tranche d'âge**

- NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute
- ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour
- ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.