

Gravité FAIBLE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave

•

Définition

Dilatation pathologique des veines du plexus hémorroïdaire anal.

•

Symptômes

- Rectorragies
- douleur anale
- prurit
- prolapsus

•

Causes

- Constipation chronique
- grossesse
- sédentarité
- effort de poussée

•

Complications

- Thrombose hémorroïdaire
- anémie chronique

•

Traitement

- Règles hygiéno-diététiques
- veinotoniques
- ligature élastique
- chirurgie si sévère

•

Diagnostic différentiel

- Autres causes de douleur abdominale
- pathologies biliaires
- pancréatiques ou intestinales

•

Examens paracliniques

- NFS
- bilan hépatique
- échographie abdominale
- endoscopie digestive selon contexte

•

Protocole médicamenteux

Règles hygiéno-diététiques, veinotoniques, ligature élastique, chirurgie si sévère



📋 Interprétation des examens

- Bilan hépatique: ALAT/ASAT >3N = cytolyse
- GGT/PAL élevées = cholestase
- Échographie: rechercher collections
- dilatations des voies biliaires



📋 Prise en charge hospitalière

- Prise en charge ambulatoire
- consultation de contrôle à 7-14 jours
- Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage
- Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récives



📋📋📋📋 Protocole par tranche d'âge

- NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute
- ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour
- ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.