

Gravité FAIBLE

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave



❏ Définition

Trouble fonctionnel digestif chronique sans lésion organique identifiable.



❏ Symptômes

Douleurs abdominales

ballonnements

alternance diarrhée-constipation



⚠️ Complications

Retentissement sur la qualité de vie



❏ Causes

Origine multifactorielle : dysmotilité

hypersensibilité viscérale

stress



❏ Traitement

Règles hygiéno-diététiques

antispasmodiques

probiotiques

gestion du stress



❏ Diagnostic différentiel

Autres causes de douleur abdominale

pathologies biliaires

pancréatiques ou intestinales



❏ Examens paracliniques

NFS

bilan hépatique

échographie abdominale

endoscopie digestive selon contexte



❏ Protocole médicamenteux

Règles hygiéno-diététiques, antispasmodiques, probiotiques, gestion du stress

Interprétation des examens

Bilan hépatique: ALAT/ASAT >3N = cytolyse

GGT/PAL élevées = cholestase

Échographie: rechercher collections

dilatations des voies biliaires

Prise en charge hospitalière

Prise en charge ambulatoire

consultation de contrôle à 7-14 jours

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récives

Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ Avertissement : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.