

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave



Définition

Interruption brutale de la circulation sanguine cérébrale par occlusion artérielle.



Symptômes

Déficit moteur/sensitif brutal

troubles du langage

asymétrie faciale

troubles visuels



Complications

Séquelles neurologiques permanentes

décès

transformation hémorragique



Causes

Athérosclérose

embolie cardiaque

dissection artérielle



Traitement

Thrombolyse IV si délai <4h30

thrombectomie mécanique

prévention secondaire



Diagnostic différentiel

Autres causes de céphalées

de déficit neurologique ou de troubles de conscience



Examens paracliniques

Scanner ou IRM cérébrale

EEG si suspicion de crise

bilan biologique standard



Protocole médicamenteux

Thrombolyse IV si délai <4h30, thrombectomie mécanique, prévention secondaire



📋 Interprétation des examens

Imagerie cérébrale: rechercher lésion ischémique hémorragique ou tumorale selon le contexte clinique



📋 Prise en charge hospitalière

Admission urgences évaluation ABCDE monitoring continu (scope SpO2 PA) Pose VVP x2 gros calibre

bilan sanguin urgent Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité Surveillance rapprochée

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage Planification du suivi post-hospitalisation



📋📋📋📋 Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠️ **Avertissement** : ⚠️ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.