

**Gravité GRAVE**

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave

•

**Définition**

Maladie neurodégénérative caractérisée par un déclin cognitif progressif et irréversible.

•

**Symptômes**

- Troubles de la mémoire
- désorientation
- troubles du langage
- changements de comportement

•

**Causes**

Dégénérescence neuronale par dépôts amyloïdes et dégénérescence neurofibrillaire

•

**Complications**

- Perte totale d'autonomie
- troubles du comportement sévères
- grabatisation

•

**Traitement**

- Prise en charge symptomatique
- stimulation cognitive
- accompagnement
- structures adaptées

•

**Diagnostic différentiel**

- Autres causes de céphalées
- de déficit neurologique ou de troubles de conscience

•

**Examens paracliniques**

- Scanner ou IRM cérébrale
- EEG si suspicion de crise
- bilan biologique standard

•

**Protocole médicamenteux**

Prise en charge symptomatique, stimulation cognitive, accompagnement, structures adaptées



## 📄 Interprétation des examens

Imagerie cérébrale: rechercher lésion ischémique

hémorragique ou tumorale selon le contexte clinique



## 📄 Prise en charge hospitalière

Hospitalisation en service spécialisé selon gravité

Surveillance rapprochée des constantes

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récides



## 📄📄📄📄📄 Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.