

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave



Définition

Infection virale grave du parenchyme cérébral due au virus herpès simplex.



Symptômes

Fièvre céphalées confusion crises comitiales

troubles du comportement



Causes

Virus herpès simplex de type 1 le plus souvent



Complications

Séquelles neurologiques sévères décès si non traité



Traitement

Aciclovir IV en urgence réanimation si besoin



Diagnostic différentiel

Autres causes de céphalées de déficit neurologique ou de troubles de conscience



Examens paracliniques

Scanner ou IRM cérébrale EEG si suspicion de crise bilan biologique standard



Protocole médicamenteux

Aciclovir IV en urgence, réanimation si besoin



Interprétation des examens

Imagerie cérébrale: rechercher lésion ischémique hémorragique ou tumorale selon le contexte clinique



Prise en charge hospitalière

- Admission urgences
- évaluation ABCDE
- monitoring continu (scope
- SpO2
- PA)
- Pose VVP x2 gros calibre
- bilan sanguin urgent
- Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité
- Surveillance rapprochée
- Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage
- Planification du suivi post-hospitalisation



Protocole par tranche d'âge

- NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute
- ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour
- ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ Avertissement : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.