

Gravité MOYENNE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave

Définition

Infection de la gorge par Streptococcus pyogenes (groupe A).

Symptômes

Mal de gorge intense

fièvre >38.5°C

adénopathies cervicales

exsudat amygdalien

Causes

Streptocoque bêta-hémolytique du groupe A

transmission gouttelettes

Complications

RAA

glomérulonéphrite

abcès péri-amygdalien

scarlatine

Traitement

Amoxicilline 6 jours

TDR streptocoque avant traitement

Diagnostic différentiel

Mononucléose

angine virale

diphthérie

angine de Vincent

herpangine

Examens paracliniques

TDR streptocoque A (résultat en 5 min)

score de Mclsaac

culture gorge si TDR négatif

Protocole médicamenteux

Amoxicilline 50mg/kg/j (enfant) ou 2g/j (adulte) en 2 prises pendant 6 jours; Si allergie: Azithromycine 500mg J1 puis 250mg/j 4j

☐ Interprétation des examens

Interpréter les résultats en corrélation avec la clinique

Valeurs normales à vérifier selon les normes du laboratoire

Répéter les examens si résultats discordants avec la clinique

☐ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation courte durée ou surveillance ambulatoire selon évolution

Réévaluation clinique à 48-72h

adaptation thérapeutique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récurrences

☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.