

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave



Définition

Fracture de l'extrémité supérieure du fémur, fréquente chez le sujet âgé ostéoporotique.



Symptômes

Douleur de hanche

impossibilité de se lever

raccourcissement et rotation externe du membre



Causes

Chute chez le sujet âgé

ostéoporose

traumatisme à haute énergie chez le sujet jeune



Complications

Nécrose de la tête fémorale

pseudarthrose

perte d'autonomie

décès (mortalité élevée)



Traitement

Chirurgie (ostéosynthèse ou prothèse) en urgence relative

prévention des complications de décubitus



Diagnostic différentiel

Autres causes de douleur articulaire ou osseuse

pathologies inflammatoires ou mécaniques



Examens paracliniques

Radiographie standard

bilan inflammatoire (CRP/VS)

IRM si besoin



Protocole médicamenteux

Chirurgie (ostéosynthèse ou prothèse) en urgence relative, prévention des complications de décubitus



📄 **Interprétation des examens**

- CRP/VS: CRP>5mg/L = inflammation
- Radiographie: rechercher pincement articulaire
- érosions
- déminéralisation



📄 **Prise en charge hospitalière**

- Admission urgences
- évaluation ABCDE
- monitoring continu (scope
- SpO2
- PA)
- Pose VVP x2 gros calibre
- bilan sanguin urgent
- Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité
- Surveillance rapprochée
- Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage
- Planification du suivi post-hospitalisation



📄 **Protocole par tranche d'âge**

- NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute
- ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour
- ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.