

Gravité MOYENNE

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave

•

Définition

Prolifération maligne développée aux dépens de la glande prostatique.

•

Symptômes

- Souvent asymptomatique au stade précoce
- troubles urinaires
- douleurs osseuses si métastatique

•

Causes

- Âge avancé
- prédisposition génétique
- facteurs hormonaux

•

Complications

- Métastases osseuses
- compression médullaire
- insuffisance rénale obstructive

•

Traitement

- Surveillance active
- chirurgie
- radiothérapie
- hormonothérapie selon le stade

•

Diagnostic différentiel

- Autres hémopathies ou cytopénies de présentation proche

•

Examens paracliniques

- NFS avec frottis sanguin
- bilan de coagulation
- myélogramme si besoin

•

Protocole médicamenteux

Surveillance active, chirurgie, radiothérapie, hormonothérapie selon le stade



📄 Interprétation des examens

- NFS: Rechercher anémie (Hb<12g/dL femme
- <13 homme)
- hyperleucocytose ou leucopénie
- thrombopénie



📄 Prise en charge hospitalière

- Hospitalisation courte durée ou surveillance ambulatoire selon évolution
- Réévaluation clinique à 48-72h
- adaptation thérapeutique
- Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage
- Planification du suivi



📄📄📄📄📄 Protocole par tranche d'âge

- NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute
- ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour
- ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.