

Gravité GRAVE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave



Définition

Maladie hémorragique héréditaire liée à un déficit en facteur de coagulation VIII ou IX.



Symptômes

Hémarthroses spontanées

hématomes profonds

saignements prolongés après traumatisme



Complications

Arthropathie hémophilique chronique

hémorragies cérébrales



Causes

Anomalie génétique liée au chromosome X (transmission récessive liée à l'X)



Traitement

Substitution en facteur de coagulation

prophylaxie régulière

éviction des traumatismes



Diagnostic différentiel

Autres hémopathies ou cytopénies de présentation proche



Examens paracliniques

NFS avec frottis sanguin

bilan de coagulation

myélogramme si besoin



Protocole médicamenteux

Substitution en facteur de coagulation, prophylaxie régulière, éviction des traumatismes

Interprétation des examens

NFS: Rechercher anémie (Hb<12g/dL femme

<13 homme)

hyperleucocytose ou leucopénie

thrombopénie

Prise en charge hospitalière

Hospitalisation en service spécialisé selon gravité

Surveillance rapprochée des constantes

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récives

Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ Avertissement : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.