

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave



Définition

Rotation du testicule sur son axe entraînant une ischémie aiguë.



Symptômes

Douleur scrotale brutale et intense

gonflement

nausées

testicule ascensionné



Causes

Anomalie de fixation testiculaire

activité physique intense

traumatisme



Complications

Nécrose testiculaire et perte de l'organe si prise en charge tardive



Traitement

Chirurgie de détorsion en extrême urgence (délai <6h)



Diagnostic différentiel

Autres néphropathies ou causes de troubles urinaires



Examens paracliniques

Ionogramme sanguin

créatinine

ECBU

échographie rénale et des voies urinaires



Protocole médicamenteux

Chirurgie de détorsion en extrême urgence (délai <6h)



Interprétation des examens

Créatinine: Élevée si >120μmol/L homme

>100 femme

Calculer DFG (CKD-EPI)

IRA si élévation aiguë



Prise en charge hospitalière

Admission urgences

évaluation ABCDE

monitoring continu (scope

SpO2

PA)

Pose VVP x2 gros calibre

bilan sanguin urgent

Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité

Surveillance rapprochée

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation



Protocole par tranche d'âge

- NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute
- ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour
- ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ Avertissement : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.