

Gravité MOYENNE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave



▮ Définition

Affection de l'oreille interne caractérisée par des crises de vertiges récurrentes.



▮ Symptômes

Vertiges rotatoires

acouphènes

hypoacousie fluctuante

sensation de plénitude auriculaire



▮ Causes

Hydrops endolymphatique

cause précise inconnue



⚠ Complications

Surdit   d  finitive progressive

retentissement fonctionnel majeur



▮ Traitement

R  gime pauvre en sel

diur  tiques

b  tahistine

chirurgie en dernier recours



▮ Diagnostic diff  rentiel

Autres pathologies ORL ou ophtalmologiques de pr  sentation proche



▮ Examens paracliniques

Examen clinique sp  cialis  

imagerie ou examen fonctionnel selon contexte



▮ Protocole m  dicamenteux

R  gime pauvre en sel, diur  tiques, b  tahistine, chirurgie en dernier recours

Interprétation des examens

Interpréter les résultats en corrélation avec la clinique et les normes du laboratoire ou de l'examen fonctionnel

Prise en charge hospitalière

Hospitalisation courte durée ou surveillance ambulatoire selon évolution

Réévaluation clinique à 48-72h

adaptation thérapeutique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi

Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ Avertissement : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.