

•

Définition

Saignement provenant des fosses nasales.

•

Symptômes

Écoulement de sang par une ou deux narines

parfois déglutition de sang

•

Causes

Traumatisme

hypertension artérielle

trouble de la coagulation

sécheresse nasale

•

Complications

Anémie si récidivante

choc hémorragique si abondante

•

Traitement

Compression digitale

mèche nasale

cautérisation si récidivante

•

Diagnostic différentiel

Autres pathologies ORL ou ophtalmologiques de présentation proche

•

Examens paracliniques

Examen clinique spécialisé

imagerie ou examen fonctionnel selon contexte

•

Protocole médicamenteux

Compression digitale, mèche nasale, cautérisation si récidivante

Interprétation des examens

Interpréter les résultats en corrélation avec la clinique et les normes du laboratoire ou de l'examen fonctionnel

Prise en charge hospitalière

Prise en charge ambulatoire

consultation de contrôle à 7-14 jours

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récives

Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ Avertissement : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.