

Gravité FAIBLE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave



Définition

Tumeur bénigne développée aux dépens du muscle utérin.



Symptômes

Ménorragies

pesanteur pelvienne

pollakiurie

souvent asymptomatique



Causes

Hormono-dépendance aux œstrogènes

prédisposition génétique



Complications

Anémie chronique

compression d'organes de voisinage

infertilité



Traitement

Surveillance si asymptomatique

traitement hormonal

myomectomie ou hystérectomie si sévère



Diagnostic différentiel

Autres pathologies gynécologiques ou obstétricales de présentation proche



Examens paracliniques

Échographie pelvienne

bilan biologique (bêta-hCG si besoin)

bilan hormonal



Protocole médicamenteux

Surveillance si asymptomatique, traitement hormonal, myomectomie ou hystérectomie si sévère

■

▣▣ Interprétation des examens

Échographie: Examen opérateur-dépendant

bêta-hCG quantitatif si suspicion de grossesse

■

▣▣ Prise en charge hospitalière

Prise en charge ambulatoire

consultation de contrôle à 7-14 jours

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récides

■

▣▣▣▣▣ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.