

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave



Définition

Saignement utérin abondant survenant après l'accouchement.



Symptômes

Saignement vaginal abondant

hypotension

tachycardie

pâleur



Causes

Atonie utérine

rétention placentaire

déchirure des voies génitales

trouble de la coagulation



Complications

Choc hémorragique

coagulation intravasculaire disséminée

décès maternel



Traitement

Massage utérin

ocytociques

révision utérine

chirurgie ou embolisation si réfractaire



Diagnostic différentiel

Autres pathologies gynécologiques ou obstétricales de présentation proche



Examens paracliniques

Échographie pelvienne

bilan biologique (bêta-hCG si besoin)

bilan hormonal



Protocole médicamenteux

Massage utérin, ocytociques, révision utérine, chirurgie ou embolisation si réfractaire



📋 Interprétation des examens

Échographie: Examen opérateur-dépendant

bêta-hCG quantitatif si suspicion de grossesse



📋 Prise en charge hospitalière

Admission urgences

évaluation ABCDE

monitoring continu (scope

SpO2

PA)

Pose VVP x2 gros calibre

bilan sanguin urgent

Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité

Surveillance rapprochée

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation



📋 Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.