



Définition

Formation liquidienne bénigne de l'ovaire liée au cycle menstruel.



Symptômes

Souvent asymptomatique

douleur pelvienne si volumineux ou compliqué

irrégularités menstruelles



Causes

Dysfonctionnement de l'ovulation



Complications

Torsion d'annexe

rupture avec hémopéritoine



Traitement

Surveillance échographique

contraception si récidivant

chirurgie si complication



Diagnostic différentiel

Autres pathologies gynécologiques ou obstétricales de présentation proche



Examens paracliniques

Échographie pelvienne

bilan biologique (bêta-hCG si besoin)

bilan hormonal



Protocole médicamenteux

Surveillance échographique, contraception si récidivant, chirurgie si complication



📄 **Interprétation des examens**

Échographie: Examen opérateur-dépendant

bêta-hCG quantitatif si suspicion de grossesse



📄 **Prise en charge hospitalière**

Prise en charge ambulatoire

consultation de contrôle à 7-14 jours

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récives



📄📄📄📄 **Protocole par tranche d'âge**

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.