

Gravité GRAVE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave



Définition

Trouble du comportement alimentaire caractérisé par une restriction alimentaire volontaire sévère.



Symptômes

- Amaigrissement important
- peur intense de prendre du poids
- aménorrhée
- hyperactivité physique



Causes

- Facteurs psychologiques
- socioculturels et génétiques multiples



Complications

- Dénutrition sévère
- troubles cardiaques
- ostéoporose
- décès (mortalité élevée)



Traitement

- Prise en charge pluridisciplinaire
- renutrition progressive
- psychothérapie
- hospitalisation si sévère



Diagnostic différentiel

- Autres troubles psychiatriques ou causes organiques de présentation proche



Examens paracliniques

- Évaluation clinique psychiatrique structurée
- élimination d'une cause organique



Protocole médicamenteux

Prise en charge pluridisciplinaire, renutrition progressive, psychothérapie, hospitalisation si sévère



📋 Interprétation des examens

Évaluation structurée selon critères diagnostiques (DSM/CIM)

éliminer une cause organique sous-jacente



📋 Prise en charge hospitalière

Hospitalisation en service spécialisé selon gravité

Surveillance rapprochée des constantes

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récides



📋📋📋📋📋 Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.