

Gravité MOYENNE

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave



■ Définition

Trouble anxieux caractérisé par des obsessions et des compulsions répétitives.



■ Symptômes

Pensées intrusives récurrentes

rituels de vérification ou de lavage

anxiété si non réalisés



■ Causes

Facteurs génétiques et neurobiologiques

dysfonctionnement des circuits cérébraux



⚠ Complications

Retentissement majeur sur la vie quotidienne

isolement social



■ Traitement

Thérapie cognitivo-comportementale avec exposition

inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine



■ Diagnostic différentiel

Autres troubles psychiatriques ou causes organiques de présentation proche



■ Examens paracliniques

Évaluation clinique psychiatrique structurée

élimination d'une cause organique



■ Protocole médicamenteux

Thérapie cognitivo-comportementale avec exposition, inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine



📋 **Interprétation des examens**

Évaluation structurée selon critères diagnostiques (DSM/CIM)

éliminer une cause organique sous-jacente



📋 **Prise en charge hospitalière**

Hospitalisation courte durée ou surveillance ambulatoire selon évolution

Réévaluation clinique à 48-72h

adaptation thérapeutique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi



📋📋📋📋 **Protocole par tranche d'âge**

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠️ **Avertissement** : ⚠️ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.