

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave



Définition

Syndrome de sevrage alcoolique sévère mettant en jeu le pronostic vital.



Symptômes

Confusion

agitation

hallucinations

tremblements

fièvre

troubles neurovégétatifs



Causes

Sevrage brutal d'alcool chez un patient dépendant



Complications

Convulsions

collapsus cardiovasculaire

décès



Traitement

Benzodiazépines à fortes doses

réhydratation

vitaminothérapie B1

surveillance rapprochée



Diagnostic différentiel

Autres troubles psychiatriques ou causes organiques de présentation proche



Examens paracliniques

Évaluation clinique psychiatrique structurée

élimination d'une cause organique



Protocole médicamenteux

Benzodiazépines à fortes doses, réhydratation, vitaminothérapie B1, surveillance rapprochée



📋 Interprétation des examens

Évaluation structurée selon critères diagnostiques (DSM/CIM)

éliminer une cause organique sous-jacente



📋 Prise en charge hospitalière

Admission urgences

évaluation ABCDE

monitoring continu (scope

SpO2

PA)

Pose VVP x2 gros calibre

bilan sanguin urgent

Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité

Surveillance rapprochée

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation



📋📋📋📋 Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.