

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave



Définition

Fièvre virale hémorragique grave transmise par contact avec des fluides biologiques infectés.



Symptômes

Fièvre brutale

myalgies

vomissements

diarrhée

hémorragies cutanéomuqueuses



Causes

Virus Ebola

transmission interhumaine par contact direct avec fluides corporels



Complications

Choc hypovolémique

défaillance multiviscérale

décès (mortalité très élevée)



Traitement

Traitement symptomatique intensif

isolement strict

anticorps monoclonaux si disponibles



Diagnostic différentiel

Autres maladies infectieuses fébriles de la zone tropicale



Examens paracliniques

NFS

bilan inflammatoire

sérologies ou PCR spécifiques

hémocultures si fièvre



Protocole médicamenteux

Traitement symptomatique intensif, isolement strict, anticorps monoclonaux si disponibles



📄 **Interprétation des examens**

- Sérologie: IgM = infection récente
- IgG = infection ancienne
- PCR: haute sensibilité et spécificité
- résultat rapide



📄 **Prise en charge hospitalière**

- Admission urgences
- évaluation ABCDE
- monitoring continu (scope
- SpO2
- PA)
- Pose VVP x2 gros calibre
- bilan sanguin urgent
- Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité
- Surveillance rapprochée
- Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage
- Planification du suivi post-hospitalisation



📄 **Protocole par tranche d'âge**

- NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute
- ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour
- ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.