

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave



Définition

Pénétration d'un segment intestinal dans le segment d'aval, urgence chirurgicale du nourrisson.



Symptômes

Douleurs abdominales paroxystiques

vomissements

rectorragies (gelée de groseille)

pâleur



Causes

Idiopathique le plus souvent chez le nourrisson

hyperplasie lymphoïde post-virale



Complications

Nécrose intestinale

perforation

péritonite



Traitement

Réduction par lavement hydrostatique ou pneumatique

chirurgie si échec



Diagnostic différentiel

Autres pathologies pédiatriques ou malformatives de présentation proche



Examens paracliniques

Examen clinique pédiatrique complet

bilan biologique et imagerie selon contexte



Protocole médicamenteux

Réduction par lavement hydrostatique ou pneumatique, chirurgie si échec



📋 Interprétation des examens

Interpréter selon les courbes de croissance et les normes pédiatriques spécifiques à l'âge



📋 Prise en charge hospitalière

- Admission urgences
- évaluation ABCDE
- monitoring continu (scope
- SpO2
- PA)
- Pose VVP x2 gros calibre
- bilan sanguin urgent
- Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité
- Surveillance rapprochée
- Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage
- Planification du suivi post-hospitalisation



📋📋📋📋📋 Protocole par tranche d'âge

- NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute
- ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour
- ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.