

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave

•

Définition

Hémolyse fœtale ou néonatale par incompatibilité sanguine materno-fœtale.

•

Symptômes

Ictère précoce et intense

anémie

hépatosplénomégalie

•

Causes

Incompatibilité Rhésus ou ABO entre mère et fœtus

•

Complications

Ictère nucléaire (encéphalopathie bilirubinique)

anasarque fœto-placentaire

•

Traitement

Photothérapie

exsanguino-transfusion si sévère

prévention par immunoglobulines anti-D

•

Diagnostic différentiel

Autres pathologies pédiatriques ou malformatives de présentation proche

•

Examens paracliniques

Examen clinique pédiatrique complet

bilan biologique et imagerie selon contexte

•

Protocole médicamenteux

Photothérapie, exsanguino-transfusion si sévère, prévention par immunoglobulines anti-D



📋 Interprétation des examens

Interpréter selon les courbes de croissance et les normes pédiatriques spécifiques à l'âge



📋 Prise en charge hospitalière

- Admission urgences
- évaluation ABCDE
- monitoring continu (scope
- SpO2
- PA)
- Pose VVP x2 gros calibre
- bilan sanguin urgent
- Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité
- Surveillance rapprochée
- Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage
- Planification du suivi post-hospitalisation



📋📋📋📋📋 Protocole par tranche d'âge

- NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute
- ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour
- ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.