

Gravité MOYENNE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave



Définition

Anomalie du développement de l'articulation coxo-fémorale présente dès la naissance.



Symptômes

- Asymétrie des plis cutanés
- limitation de l'abduction de hanche
- ressaut à l'examen



Causes

- Laxité ligamentaire
- présentation par le siège
- antécédents familiaux



Complications

- Boiterie
- arthrose précoce de hanche si non traitée



Traitement

- Dépistage systématique néonatal
- harnais d'abduction
- chirurgie si diagnostic tardif



Diagnostic différentiel

- Autres pathologies pédiatriques ou malformatives de présentation proche



Examens paracliniques

- Examen clinique pédiatrique complet
- bilan biologique et imagerie selon contexte



Protocole médicamenteux

Dépistage systématique néonatal, harnais d'abduction, chirurgie si diagnostic tardif



📄 Interprétation des examens

Interpréter selon les courbes de croissance et les normes pédiatriques spécifiques à l'âge



📄 Prise en charge hospitalière

Hospitalisation courte durée ou surveillance ambulatoire selon évolution

Réévaluation clinique à 48-72h

adaptation thérapeutique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi



📄📄📄📄📄 Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.