

Gravité MOYENNE

URGENCE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave



Définition

Crises convulsives survenant chez le jeune enfant en contexte de fièvre, sans infection du système nerveux central.



Symptômes

Crise tonico-clonique généralisée brève associée à une fièvre élevée



Causes

Immaturité cérébrale

prédisposition génétique

fièvre élevée d'apparition rapide



Complications

Récidives

très rarement épilepsie ultérieure



Traitement

Antipyrétiques

benzodiazépine si crise prolongée

rassurance parentale



Diagnostic différentiel

Autres pathologies pédiatriques ou malformatives de présentation proche



Examens paracliniques

Examen clinique pédiatrique complet

bilan biologique et imagerie selon contexte



Protocole médicamenteux

Antipyrétiques, benzodiazépine si crise prolongée, rassurance parentale



📄 Interprétation des examens

Interpréter selon les courbes de croissance et les normes pédiatriques spécifiques à l'âge



📄 Prise en charge hospitalière

Hospitalisation courte durée ou surveillance ambulatoire selon évolution

Réévaluation clinique à 48-72h

adaptation thérapeutique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi



📄📄📄📄📄 Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.