

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave

●

■ Définition

Élévation dangereuse de la température corporelle par défaillance des mécanismes de thermorégulation.

●

■ Symptômes

Hyperthermie majeure

troubles de conscience

peau chaude et sèche

tachycardie

●

⚠ Complications

Défaillance multiviscérale

coagulation intravasculaire disséminée

décès

●

■ Causes

Exposition prolongée à une chaleur intense

effort physique intense en ambiance chaude

●

■ Traitement

Refroidissement corporel rapide

réhydratation

surveillance en réanimation si sévère

●

■ Diagnostic différentiel

Autres urgences toxicologiques ou environnementales

●

■ Examens paracliniques

Bilan biologique orienté selon le toxique

gazométrie

ECG

●

■ Protocole médicamenteux

Refroidissement corporel rapide, réhydratation, surveillance en réanimation si sévère



📋 Interprétation des examens

Interpréter selon le toxique en cause

dosages spécifiques si disponibles



📋 Prise en charge hospitalière

Admission urgences

évaluation ABCDE

monitoring continu (scope

SpO2

PA)

Pose VVP x2 gros calibre

bilan sanguin urgent

Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité

Surveillance rapprochée

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation



📋📋📋📋📋 Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.