

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave



Définition

Lésion tissulaire causée par la chaleur, dont l'étendue conditionne la gravité.



Symptômes

Douleur

phlyctènes

destruction cutanée de profondeur variable selon le degré



Causes

Flamme

liquide chaud

contact avec surface brûlante

explosion



Complications

Choc hypovolémique

infection

séquelles cicatricielles et fonctionnelles



Traitement

Refroidissement immédiat

réhydratation adaptée à la surface brûlée

soins spécialisés en centre de brûlés



Diagnostic différentiel

Autres urgences toxicologiques ou environnementales



Examens paracliniques

Bilan biologique orienté selon le toxique

gazométrie

ECG



Protocole médicamenteux

Refroidissement immédiat, réhydratation adaptée à la surface brûlée, soins spécialisés en centre de brûlés



📄 **Interprétation des examens**

Interpréter selon le toxique en cause

dosages spécifiques si disponibles



📄 **Prise en charge hospitalière**

Admission urgences

évaluation ABCDE

monitoring continu (scope

SpO2

PA)

Pose VVP x2 gros calibre

bilan sanguin urgent

Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité

Surveillance rapprochée

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation



📄 **Protocole par tranche d'âge**

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.