

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave



Definition

Insuffisance respiratoire aiguë sévère par atteinte diffuse des poumons.



Symptômes

Dyspnée sévère

hypoxémie réfractaire

opacités pulmonaires bilatérales



Causes

Pneumopathie sévère

sepsis

inhalation

pancréatite grave

traumatisme



Complications

Hypoxémie réfractaire

défaillance multiviscérale

décès



Traitement

Ventilation mécanique protectrice

décubitus ventral

traitement de la cause

réanimation



Diagnostic différentiel

Autres maladies infectieuses ou carentielles de présentation proche



Examens paracliniques

NFS

bilan inflammatoire

sérologies ou examens parasitologiques spécifiques



Protocole médicamenteux

Ventilation mécanique protectrice, décubitus ventral, traitement de la cause, réanimation



📋 Interprétation des examens

Sérologie et examens parasitologiques à corrélér avec le contexte épidémiologique et clinique



📋 Prise en charge hospitalière

- Admission urgences
- évaluation ABCDE
- monitoring continu (scope
- SpO2
- PA)
- Pose VVP x2 gros calibre
- bilan sanguin urgent
- Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité
- Surveillance rapprochée
- Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage
- Planification du suivi post-hospitalisation



📋📋📋📋 Protocole par tranche d'âge

- NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute
- ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour
- ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.