

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave



Définition

Réponse inflammatoire systémique dysrégulée à une infection, pouvant évoluer vers un choc.



Symptômes

Fièvre ou hypothermie

tachycardie

hypotension

confusion

marbrures



Complications

Défaillance multiviscérale

coagulation intravasculaire disséminée

décès



Causes

Infection bactérienne

virale ou fongique disséminée



Traitement

Antibiothérapie probabiliste précoce

remplissage vasculaire

vasopresseurs

réanimation



Diagnostic différentiel

Autres maladies infectieuses ou carentielles de présentation proche



Examens paracliniques

NFS

bilan inflammatoire

sérologies ou examens parasitologiques spécifiques



Protocole médicamenteux

Antibiothérapie probabiliste précoce, remplissage vasculaire, vasopresseurs, réanimation



📋 Interprétation des examens

Sérologie et examens parasitologiques à corrélér avec le contexte épidémiologique et clinique



📋 Prise en charge hospitalière

- Admission urgences
- évaluation ABCDE
- monitoring continu (scope
- SpO2
- PA)
- Pose VVP x2 gros calibre
- bilan sanguin urgent
- Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité
- Surveillance rapprochée
- Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage
- Planification du suivi post-hospitalisation



📋📋📋📋📋 Protocole par tranche d'âge

- NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute
- ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour
- ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.