

**Gravité GRAVE**

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave



## Définition

Hypertrophie et dilatation du ventricule droit secondaires à une pathologie respiratoire chronique.



## Symptômes

Dyspnée

œdèmes des membres inférieurs

turgescence jugulaire

cyanose



## Causes

BPCO évoluée

fibrose pulmonaire

hypertension artérielle pulmonaire chronique



## Complications

Insuffisance cardiaque droite terminale

décès



## Traitement

Oxygénothérapie de longue durée

traitement de la pathologie respiratoire sous-jacente

diurétiques



## Diagnostic différentiel

Autres causes de douleur thoracique

embolie pulmonaire

dissection aortique

causes digestives



## Examens paracliniques

ECG

troponine

échocardiographie

bilan lipidique

radiographie thoracique



## Protocole médicamenteux

Oxygénothérapie de longue durée, traitement de la pathologie respiratoire sous-jacente, diurétiques



**📋 Interprétation des examens**

- ECG: Rechercher signes d'ischémie (sus/sous-décalage ST)      troubles du rythme
- Troponine: Élévation = souffrance myocardique



**📋 Prise en charge hospitalière**

- Hospitalisation en service spécialisé selon gravité      Surveillance rapprochée des constantes
- Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage      Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récives



**📋 Protocole par tranche d'âge**

- NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute
- ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour
- ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.