

Gravité FAIBLE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave



Définition

Toux persistant plus de 8 semaines nécessitant une recherche étiologique.



Symptômes

- Toux persistante sèche ou productive
- parfois associée à un reflux ou un écoulement nasal postérieur



Causes

- Asthme
- reflux gastro-œsophagien
- écoulement nasal postérieur
- médicaments (IEC)



Complications

- Retentissement sur la qualité de vie
- incontinence urinaire d'effort associée



Traitement

- Traitement étiologique selon la cause identifiée



Diagnostic différentiel

- Autres pneumopathies
- insuffisance cardiaque
- embolie pulmonaire
- cancer bronchique



Examens paracliniques

- Radiographie thoracique
- gazométrie artérielle
- NFS
- CRP
- scanner thoracique si besoin



Protocole médicamenteux

Traitement étiologique selon la cause identifiée

Interprétation des examens

Gazométrie: pH 7.35-7.45

PaO2>80mmHg

PaCO2 35-45mmHg

Radiographie: rechercher opacités

épanchements

pneumothorax

Prise en charge hospitalière

Prise en charge ambulatoire

consultation de contrôle à 7-14 jours

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récives

Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ Avertissement : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.