

Gravité MOYENNE

URGENCE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave



Définition

Déchirure de la muqueuse à la jonction œso-gastrique liée à des vomissements violents.



Symptômes

Hématémèse après vomissements répétés

douleur thoracique basse



Complications

Hémorragie digestive parfois abondante



Causes

Vomissements violents et répétés

alcoolisme aigu

grossesse (hyperémèse)



Traitement

Traitement symptomatique

endoscopie hémostatique si saignement actif



Diagnostic différentiel

Autres causes de douleur abdominale

pathologies biliaires

pancréatiques ou intestinales



Examens paracliniques

NFS

bilan hépatique

échographie abdominale

endoscopie digestive selon contexte



Protocole médicamenteux

Traitement symptomatique, endoscopie hémostatique si saignement actif



📄 **Interprétation des examens**

Bilan hépatique: ALAT/ASAT >3N = cytolyse

Échographie: rechercher collections

dilatations des voies biliaires



📄 **Prise en charge hospitalière**

Hospitalisation courte durée ou surveillance ambulatoire selon évolution

Réévaluation clinique à 48-72h

adaptation thérapeutique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi



📄📄📄📄 **Protocole par tranche d'âge**

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.