

Gravité FAIBLE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave

●

Définition

Formation localisée au sein du parenchyme thyroïdien, le plus souvent bénigne.

●

Symptômes

- Masse cervicale palpable
- souvent asymptomatique
- gêne locale si volumineux

●

Causes

- Carence en iode
- dystrophie thyroïdienne
- mutation génétique (rare)

●

Complications

- Compression trachéale si volumineux
- transformation maligne (minoritaire)

●

Traitement

- Surveillance échographique
- cytoponction si suspect
- chirurgie si maligne ou compressive

●

Diagnostic différentiel

- Autres troubles métaboliques ou hormonaux de présentation proche

●

Examens paracliniques

- Bilan hormonal spécifique
- glycémie
- ionogramme sanguin
- imagerie selon contexte

●

Protocole médicamenteux

Surveillance échographique, cytoponction si suspect, chirurgie si maligne ou compressive



📋 Interprétation des examens

Interpréter les dosages hormonaux en tenant compte du contexte clinique et des valeurs de référence



📋 Prise en charge hospitalière

Prise en charge ambulatoire

consultation de contrôle à 7-14 jours

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récides



📋📋📋📋📋 Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.