

Gravité MOYENNE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave



Définition

Infection bactérienne aiguë de la prostate.



Symptômes

Fièvre, douleur périnéale, brûlures mictionnelles, dysurie, toucher rectal douloureux



Causes

Escherichia coli principalement, infection urinaire ascendante



Complications

Rétention urinaire aiguë, abcès prostatique, septicémie



Traitement

Antibiothérapie prolongée adaptée (fluoroquinolones), antalgiques



Diagnostic différentiel

Autres néphropathies ou causes de troubles urinaires



Examens paracliniques

Ionogramme sanguin, créatinine, ECBU, échographie rénale et des voies urinaires



Protocole médicamenteux

Antibiothérapie prolongée adaptée (fluoroquinolones), antalgiques



Interprétation des examens

Créatinine: Élevée si >120µmol/L homme

>100 femme

Calculer DFG (CKD-EPI)



Prise en charge hospitalière

Hospitalisation courte durée ou surveillance ambulatoire selon évolution

Réévaluation clinique à 48-72h

adaptation thérapeutique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi



Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ Avertissement : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.