

Gravité MOYENNE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave

•

Définition

Inflammation aiguë du larynx, fréquente chez l'enfant sous forme de laryngite sous-glottique.

•

Symptômes

- Toux rauque aboyante
- dysphonie
- stridor inspiratoire
- dyspnée si sévère

•

Causes

- Infection virale le plus souvent
- exposition à des irritants

•

Complications

- Détresse respiratoire aiguë chez le jeune enfant (laryngite sous-glottique sévère)

•

Traitement

- Corticoïdes (dexaméthasone)
- aérosols d'adrénaline si sévère
- air humidifié

•

Diagnostic différentiel

- Autres pathologies ORL ou ophtalmologiques de présentation proche

•

Examens paracliniques

- Examen clinique spécialisé
- imagerie ou examen fonctionnel selon contexte

•

Protocole médicamenteux

Corticoïdes (dexaméthasone), aérosols d'adrénaline si sévère, air humidifié



📄 **Interprétation des examens**

Interpréter les résultats en corrélation avec la clinique et les normes de l'examen fonctionnel



📄 **Prise en charge hospitalière**

Hospitalisation courte durée ou surveillance ambulatoire selon évolution

Réévaluation clinique à 48-72h

adaptation thérapeutique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi



📄📄📄📄 **Protocole par tranche d'âge**

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.