

Gravité FAIBLE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave



Définition

Infection du sein survenant pendant l'allaitement.



Symptômes

- Douleur mammaire
- rougeur localisée
- fièvre
- induration



Causes

- Staphylocoque doré
- stase lactée
- crevasses du mamelon



Complications

- Abcès du sein
- sepsis maternel



Traitement

- Poursuite de l'allaitement ou vidange du sein
- antibiothérapie si nécessaire



Diagnostic différentiel

- Autres pathologies gynécologiques ou obstétricales de présentation proche



Examens paracliniques

- Échographie pelvienne
- bilan biologique (bêta-hCG si besoin)
- bilan hormonal



Protocole médicamenteux

Poursuite de l'allaitement ou vidange du sein, antibiothérapie si nécessaire



📋 Interprétation des examens

Échographie: examen opérateur-dépendant

bêta-hCG quantitatif si suspicion de grossesse



📋 Prise en charge hospitalière

Prise en charge ambulatoire

consultation de contrôle à 7-14 jours

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récives



📋📋📋📋📋 Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.