

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave

Définition

État de crise psychique au cours duquel la personne envisage sérieusement de mettre fin à ses jours.

Symptômes

Idées noires

désespoir

sentiment d'être un fardeau

expression d'un projet suicidaire

Causes

Dépression

trouble psychiatrique sous-jacent

événement de vie précipitant

isolement

Complications

Passage à l'acte suicidaire

décès

Traitement

Évaluation du risque en urgence

hospitalisation si risque élevé

mise en sécurité

suivi psychiatrique rapproché

Diagnostic différentiel

Autres troubles psychiatriques ou causes organiques de présentation proche

Examens paracliniques

Évaluation clinique psychiatrique structurée

élimination d'une cause organique

Protocole médicamenteux

Évaluation du risque en urgence, hospitalisation si risque élevé, mise en sécurité, suivi psychiatrique rapproché



📋 **Interprétation des examens**

Évaluation structurée selon critères diagnostiques

éliminer une cause organique sous-jacente



📋 **Prise en charge hospitalière**

Admission urgences

évaluation ABCDE

monitoring continu (scope

SpO2

PA)

Pose VVP x2 gros calibre

bilan sanguin urgent

Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité

Surveillance rapprochée

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation



📋 **Protocole par tranche d'âge**

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.